

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



LORRAINE

Bulletin n° 24 du 17 octobre 1997

GRANDES CULTURES

Colza

Les taux d'attaque de **pucerons** restent importants. Des colonies de tailles variables sont observées dans des parcelles non traitées et certaines traitées. Les comptages réalisés par les agents du SRPV montrent des taux d'infestation atteignant facilement 80 à 90 % de pieds porteurs. Rares sont les parcelles où le seuil de 20 % n'est pas atteint.

Les **larves de tenthrèdes** et les **chenilles de noctuelles** et de **teignes des crucifères** deviennent moins actives. Quelques charançons ont été piégés en fin de semaine dernière dans le secteur de Vézelize. **Traitez si au moins 20 % des pieds sont porteurs de pucerons. Utilisez de préférence une pyréthrinioïde associée. Si le seuil n'est pas atteint, attendez pour réaliser un traitement spécifique contre le charançon du bourgeon terminal.**

Céréales

Les blés et orges les plus en avance sont au stade début tallage. Les pluies de ces derniers jours devraient permettre la levée des semis les plus récents, surtout si les températures se radoucissent.

Pucerons

Les vérifications effectuées cette semaine montrent que les populations n'ont pas évolué depuis la semaine précédente, quels que soient le lieu, l'environnement de la parcelle, l'espèce et le stade de la céréale.

Tout traitement semble donc inutile dans l'immédiat. La chute brutale des températures a limité l'activité des pucerons (ils s'alimentent et se reproduisent par températures supérieures à 10°C). Le risque de les voir se développer à nouveau s'amenuise avec l'arrivée de périodes plus froides et il est possible que nous n'ayons pas à les combattre cet automne.

Nous continuons cependant à surveiller leur évolution et vous informerons en cas de changement de situation.

Limaces

Avec l'arrivée de la pluie, elles sont remontées en surface, notamment sur les terres caillouteuses du Barrois. **Continuer à surveiller et intervenir dès les premières captures ou observations de dégâts dans la parcelle.**

Désherbage

Attendre le stade 2 à 3 feuilles de la majorité des céréales pour appliquer les produits à action racinaire et foliaire. N'utiliser les produits à action uniquement foliaire que si la majorité des adventices est levée.



Pucerons : Présents dans les colzas et absents dans les céréales.

L° Jo
50614



D₃



SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél. 03.83.30.41.51

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT



P 76